

## In conclusione:

- ✚ La scabbia può colpire chiunque, non essendo necessariamente legata a cattive condizioni d'igiene personale.
- ✚ Non ci si deve vergognare di essere affetti da questa malattia.
- ✚ Bisogna subito consultare il medico di fiducia se si presentano sintomi sospetti.
- ✚ Una corretta terapia elimina facilmente il problema.



**Regione Piemonte**  
**Azienda Sanitaria Locale CN2**  
Dipartimento di Prevenzione  
S.C. SISP – S.S. Vaccinazioni, Profilassi Malattie  
Infettive, Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni

**SEDE DI ALBA**  
Via Vida, 10  
12051 ALBA  
E.mail: [vaccinazioni.alba@aslcn2.it](mailto:vaccinazioni.alba@aslcn2.it)

**SEDE DI BRA**  
Via Vittorio Emanuele, 1  
12042 BRA  
E.mail: [vaccinazioni.bra@aslcn2.it](mailto:vaccinazioni.bra@aslcn2.it)

Impaginazione e grafica a cura  
dell'Assistente Sanitaria **Antonella BORDA**




**A.S.L. CN2**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra*

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

S.C. SISP

S.S. Vaccinazioni, Profilassi Malattie Infettive,  
Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni



**SCABBIA:**  
*domande e risposte*

## Perché parlarne?

Stiamo assistendo ad un ritorno di questo problema in tutta Italia.

I sintomi della scabbia sono causati da un insetto (*Sarcoptes scabiei*) che vive all'interno della pelle: per la precisione, l'insetto scava gallerie nello strato più superficiale (strato corneo) dell'epidermide, dove depone le uova.

Anche nel nostro territorio ogni anno vengono segnalati diversi casi della malattia.

E' indispensabile che le persone conoscano le caratteristiche di questa malattia e sappiano quali sono i sintomi che impongono una immediata visita dal medico di fiducia.



## Come si trasmette la malattia?

La trasmissione da persona a persona si può verificare tra **soggetti che si trovano costantemente a stretto contatto gli uni con gli altri** (scuole, ospizi, caserme, nuclei familiari) oppure durante i rapporti sessuali.

Gli acari sopravvivono per poco tempo sui vestiti o sulla biancheria, per cui questa modalità di contagio è meno frequente.

**Il periodo di incubazione va da 2 a 8 settimane** se una persona non ha mai avuto la malattia, mentre è molto più breve, da 1 a 4 giorni, nei soggetti che si erano già ammalati in precedenza.

## Quali sono i sintomi?

Il prurito, specialmente notturno, è il sintomo più importante. Insieme al prurito, troviamo un'eruzione cutanea: la pelle è arrossata e talvolta è difficile distinguere la scabbia da altre dermatiti; il grattamento aggrava la situazione, creando le condizioni per il sovrapporsi di una infezione batterica.

All'inizio la malattia interessa più frequentemente le mani (gli spazi tra le dita, la superficie interna del polso) ma qualunque zona può essere colpita; col tempo, essa tende a generalizzarsi su tutta la superficie corporea.



## Cosa fare se ci sono sintomi sospetti?

Se si presentano i sintomi che abbiamo appena descritto, è necessario rivolgersi al medico curante: la diagnosi deve essere il più possibile precoce. In tal modo il trattamento può essere iniziato subito, prima che la scabbia si diffonda su vaste zone della pelle e prima che voi stessi diventiate a vostra volta una fonte d'infezione per gli altri.